

# C. diff ინფექცია: რისკის ქვეშ ვარ?

ანტიბიოტიკებს შეუძლიათ სიცოცხლის გადარჩენა. გამოყენებისას მათ შეიძლება გამოიწვიონ გვერდითი მოვლენები, მათ შორის C. diff ინფექცია. ანტიბიოტიკის მიღების დაწყებისას გაესაუბრეთ ჯანდაცვის სპეციალისტს C. diff ინფექციის განვითარების რისკის შესახებ.

## რა არის C. diff ინფექცია?

C. diff არის მიკრობი (ბაქტერია), რომელიც იწვევს დიარეას და კოლიტს (მსხვილი ნაწლავის ანთებას) და შეიძლება სიცოცხლისთვის საშიში იყოს.

*Clostridioides difficile* (C. diff) შეერთებულ შტატებში ყოველწლიურად თითქმის ნახევარი მილიონი ინფექციის მიზეზია.

## ვის ემუქრება C. diff ინფექციის რისკი?

C. diff-ით შეიძლება დაინფიცირდეს ნებისმიერი ადამიანი, თუმცა გარკვეული ფაქტორები ზრდის რისკს. C. diff ინფექციის შემთხვევათა უმეტესობა ანტიბიოტიკის მიღების დროს ან მის შემდეგ ვითარდება. ეს იმიტომ ხდება, რომ ანტიბიოტიკები, რომლებიც ბაქტერიულ ინფექციებს ებრძვიან მავნე მიკრობების განადგურებით, ასევე ანადგურებენ სასარგებლო მიკრობებს, რომლებიც იცავენ ორგანიზმს მავნე ინფექციებისგან, მაგალითად C. diff ინფექციებისგან.

## რისკ-ფაქტორები:



ანტიბიოტიკების გამოყენება ბოლო 3 თვის განმავლობაში



C. diff-ის ინფექცია წარსულში ან მიკრობებთან კონტაქტი



ბოლო დროს საავადმყოფოში ან მოხუცებულთა თავმესაფარში ყოფნა

65+

ხანდაზმული ასაკი



დასუსტებული იმუნური სისტემა, მაგალითად, აივ/შიდსით ან კიბოთი დაავადებული ადამიანები

თუ ანტიბიოტიკის მიღების დროს ან მის შემდეგ C. diff ინფექციის სიმპტომები განგივითარდებათ, დაუკავშირდით ჯანდაცვის სპეციალისტს განსახილველად და შეფასებისთვის.

## C. diff ინფექციის სიმპტომები:



დიარეა



ცხელება



უმადობა



გულისრევა



ტკივილი კუჭის და მუცლის არეში



შეიტყვეთ მეტი [cdc.gov/c-diff](http://cdc.gov/c-diff) [cdc.gov/antibiotic-use](http://cdc.gov/antibiotic-use)

